宮崎県泌尿器科地域医療連携 「前立腺癌/放射線治療」 PSA値が2ng/mlをこえましたら、基幹病院へ再度受診を勧めてください。 (基幹)	
	病院 ➡
氏名 排 生年月日 年月日 iPSA ng/ml ホルモン治療開始日 年月月 患者情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日 ボルモン治 F 内容 抗アンドロゲン剤単独
■ 「大く思治」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Γ N M グリソンス + = コア
宮大パス開 始(/) 1回目 (/) 2回目 (/) 3回目 (/) 4回目 (/) 5回目 (/) 6回目 (/) 7回目 (/) 8回目 (/) 9回目 (/) 10回目 (/)	11回目 12回目 13回目 (/) (/) (/)
経過観察の目安:放治後2年は3か月毎の診察、その後術後5年までは6か月毎、	以降は1年毎
PSA検 PSA	
	g/ml ng/ml ng/ml ng/ml
検査 生化学検 査、尿検 査	
LHRHアナロ グ	
抗アンドロ 使用薬剤 ゲン剤 は 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
有·無	無 有·無 有·無 有·無
排尿異常	B難 ・排尿困難 ・排尿困難 ・排尿困難
身体症状、理学 (勃起、性 ·性行為 ·性行為 ·性行為 ·性行為 ·性行為 ·性行為 ·性行為 ·性行	
その他 (排便異 常など)	
他職器癌 有・無) () () ()
その他 ·心疾患 有·無	
(他疾患) ·高血圧 有·無	無 有·無 有·無 有·無
その他	