宮崎県泌尿器科地域医療連携 「PSA経過観察」	※PSAの追加測定は適宜かかりつけ医の先生のご判断にお任せします。 **コメント**：（アボルブ使用の有無・開始時期など）	（泌尿器科医） ⟺ （かかりつけ医）

患者情報	氏名 様			生年月日 M, T, S	年 月 日	***PSA値が4.0ng/mlをこえましたら、 泌尿器科医へ受診を勧めてください。***								
	パス開始日	年 月 日		直腸診	年 月 日	iPSA	年 月 日			ng/ml	P-Vol	年 月 日		ml
	生検日	年 月 日		生検日	年 月 日	生検日	年 月 日	***生検陰性の場合はPSA値が50%上昇したら 泌尿器科医へ再度受診を勧めてください。***						
	検査結果	陰性・PINあり		検査結果	陰性・PINあり	検査結果	陰性・PINあり							
	宮大パス開始(/)	1回目 (/)	2回目 (/)	3回目 (/)	4回目 (/)	5回目 (/)	6回目 (/)	7回目 (/)	8回目 (/)	9回目 (/)	10回目 (/)	11回目 (/)	12回目 (/)	13回目 (/)
検査	PSA検査、血球・生化学検査、尿検査	**経過観察の目安：PSA値が上記基準値以下であれば経過観察（PSA～1.0ng/ml⇒3年毎測定，1.1～4.0ng/ml⇒1年毎測定）**												
		PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml	PSA ng/ml
	直腸診異常	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行
	TRUS異常	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行	有・無・未施行
	P-Vol	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml
身体症状、理学所見	排尿異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
		・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿	・尿失禁 ・排尿困難 ・頻尿
	性生活（勃起、性行為）	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為	・勃起 ・性行為
	その他（薬の副作用など）													